

INSECTES COLÉOPTÈRES QUI ENGENDRENT DES VERS BLANCS PLUS OU MOINS NUISIBLES ET QUE L'ON PEUT CONFONDRE

Les OTIORHYNQUES

1



Larve et dégats sur feuille



Otiorhynque adulte



Larve d'Otiorhynque



Dégats sur feuilles

L'Otiorhynque, aussi appelé charançon de la vigne, ou poinçonneur des lilas est un coléoptère actif uniquement la nuit. Il n'est pas visible en plein jour. Il mesure de 8 à 12 mm et sa carapace est noire tachetée de minuscules points jaunes. Les larves d'Otiorhynques sont des vers blancs avec une petite tête dure jaune brunâtre.

Les Otiorhynques ont des élytres fusionnés, ils sont donc incapables de voler, alors que les Hannetons volent.

Les larves s'attaquent aux racines. Dans un jardin où des poules évoluent, toutes les larves sont consommées... Autre remède : Nématodes en arrosage de mai à septembre.

Les HANNETONS



Hanneton adulte



Larve du hanneton, c'est le ver blanc

Les hannetons sont très nuisibles pour le jardin et les cultures, mais ils ne présentent aucun danger pour l'homme ni pour les animaux. Ils ne piquent pas.

Insecte dont le vol est caractéristique et ne passe pas inaperçu le soir au crépuscule.

Leur cycle est de trois ans. Il comprend quatre étapes principales : l'œuf (la femelle s'enterre de 5 à 20 cm pour pondre), la nymphe, la larve et l'adulte (appelé « imago »). Ce sont les larves (vers blancs) qui font des dégâts en consommant les racines. La vie du hanneton se passe donc essentiellement sous terre.

Les potagers, les cultures en conteneurs, les jeunes arbres fruitiers, peuvent être ravagés par les vers blancs.

La nuit, les hannetons sont attirés par la lumière artificielle. Attention donc aux petits luminaires dans un jardin. Dans la journée ils se cachent pour échapper aux oiseaux.

Les plus grands prédateurs des hannetons et des vers blancs sont les oiseaux insecticides, les volailles et les hérissons.

Pour éliminer ces vers blancs très nuisibles, le meilleur traitement se réalise avec des Nématodes, (*Heterorhabditis bacteriophora*).

Les NÉMATODES Hb sont des vers microscopiques naturellement présents dans le sol. Ils sont sans danger pour l'homme.

Ils se déplacent dans le sol ou sur les végétaux à la recherche de leur nourriture. Ainsi, ils parasitent et tuent en quelques jours les vers blancs des Otorhynques et des Hannetons très nuisibles dans nos jardins.

On trouve en jardinerie ces sachets de Nématodes.

(A Annecy : Jardinerie ARMATAFFET 16 Avenue ZANAROLI).

Le produit **Green** apy, c'est une poudre qui doit être diluée.

ATTENTION : Bien lire entièrement la notice pour une bonne utilisation.

La dilution doit être sérieusement réalisée.

L'application doit se faire sur un sol ou sur des substrats bien arrosés. Ils devront rester humides durant plusieurs semaines. De plus, la température du sol ou des substrats doit être supérieure à 15 °.



Les CÉTOINES



Cétoines dorées adultes



Cétoine qui aime broyer les étamines



Cétoine qui aime les rosiers



Larve de cétoine : ver blanc

Ce coléoptère qui ressemble à un petit scarabée est couramment appelé « hanneton des roses » car il est friand des roses. Sa couleur est vert métallique brillant. C'est un Insecte volant qui fait partie des pollinisateurs. Il n'est donc pas très nuisible. Sa vie dans le sol est variable.

Il peut mesurer jusqu'à 20 millimètres. Il se nourrit des étamines.

Jean-Claude MOIRON
Ingénieur. Officier du mérite Agricole
Ancien Directeur des Espaces Verts d'Annecy
Août 2026